

# Carvedilol

DILANTREND

طفلك وأمراض القلب

[www.aubmc.org](http://www.aubmc.org)



AMERICAN UNIVERSITY of BEIRUT MEDICAL CENTER

المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت

كلنا لسلامة صحتكم

الجامعة الأميركية في بيروت  
المركز الطبي  
صندوق البريد: ٢٣٦١-١١  
رياض الصلح، بيروت ٢٠٢٠ ١١٠٧  
بيروت - لبنان

# ما هو هذا الدواء؟

هو دواء من مجموعة B. Blocker التي تحبط عمل بعض المواد الكيميائية المحفزة للقلب والدورة الدموية على عضلة القلب.

## كيفية الاستخدام:

يؤخذ عن طريق الفم.  
الدواء متوفّر في الأشكال التالية:

• شراب 1 mg/ml

يمكن أن يحضّر في صيدلية مستشفى الجامعة الأميركية أو في صيدليات أخرى.



إستعمل المكيال الخاص لإعطاء الدواء ولا تستعمل ملعقة الطعام العادية.

• حبة 6.25 mg



يمكن تدوير الحبة في الماء واعطائها حسب التعليمات المعطاة.

## ماذا تفعل في حال نسيت إعطاء الجرعة:

إذا كان وقت الجرعة التالية بعد أقل من ٤ ساعات، يجب عدم إعطاء الطفل جرعة إضافية والاكتفاء بالجرعة القادمة. أما إذا كان الوقت الفاصل أكثر من ٤ ساعات، فيجب إعطاء طفلك الجرعة الناقصة في أقرب وقت ممكن.  
لا تعطِ أبداً جرعة مضاعفة.

## عوارض جانبية محتملة:

- دوخة خفيفة
- مشاكل في النوم (أرق)
- جفاف الفم

## إتصل بالطبيب فوراً إذا اشتكى الطفل من:

- عوارض الحساسية للدواء وهي طفح جلدي، وصعوبة في التنفس، وتورّم في الوجه أو اللسان.

## إرشادات عامة:

• لا توقف هذا الدواء فجأة فذلك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قلبية خطيرة.

أخبر الطبيب إذا كان الطفل:

- يعاني من الربو، أو مرض السكري، أو أمراض الكبد.
- يعاني من حساسية ضد أي دواء آخر.
- يتناول أدوية أخرى.

## دواعي الإستعمال:

- ارتفاع ضغط الدم
- تقليص عبء العمل على عضلة القلب
- في بعض حالات قصور القلب الإحتقاني