

Inderal

PROPRANOLOL

طفلك وأمراض القلب

www.aubmc.org



AMERICAN UNIVERSITY of BEIRUT MEDICAL CENTER
المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت

كلنا سلامة صحتكم

ما هو هذا الدواء؟

هو دواء من مجموعة B. Blocker التي تحبط عمل بعض المواد الكيميائية المحفزة للقلب والدورة الدموية.

كيفية الاستخدام:

يؤخذ عن طريق الفم وعلى معدة فارغة، أي ساعة قبل الطعام أو ساعتين بعد الطعام.
الدواء متوفر في الأشكال التالية:

• حبة 10 mg

• حبة 40 mg

• شراب 1 mg/ml

إلتزم دوماً بالجرعة المحددة من قبل الطبيب.

ماذا تفعل في حال نسيت إعطاء الجرعة:

إذا كان وقت الجرعة التالية بعد أقل من ٤ ساعات، يجب عدم إعطاء الطفل جرعة إضافية والانتفاء بالجرعة القادمة. أما إذا كان الوقت الفاصل أكثر من ٤ ساعات، فيجب إعطاء طفلك الجرعة الناقصة في أقرب وقت ممكن. لا تعط أبداً جرعة مضاعفة.

عوارض جانبية محتملة:

- غثيان أو قيء
- مشاكل في النوم (أرق)
- إمساك

إتصل بالطبيب فوراً إذا اشتكى الطفل من:

- عوارض الحساسية للدواء وهي طفح جلدي، وصعوبة في التنفس، وتورم في الوجه أو اللسان.
- عدم انتظام دقات القلب.

إرشادات عامة:

- لا توقف هذا الدواء فجأةً فذلك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قلبية خطيرة.
- أبلغ الطبيب عن أي أدوية أخرى يتناولها طفلك.

أخبر الطبيب إذا كان الطفل:

- يعاني من حساسية الربو، أمراض في الرئة، أو مرض السكري.
- يعاني من حساسية ضد أي دواء آخر.
- يتناول أدوية أخرى.

دواعي الإستعمال:

- تسارع دقات القلب
- ارتفاع ضغط الدم