



Renitec

ENALAPRIL

طفلك وأمراض القلب

www.aubmc.org



AMERICAN UNIVERSITY of BEIRUT MEDICAL CENTER
المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت

كلنا سلامة صحتكم

ما هو هذا الدواء؟

هو دواء من مجموعة "ACEI" «مثبطات أيه سي» يعمل على تحسين عمل عضلة القلب، تدفق وعلاج الضغط العالي.

كيفية الاستخدام:

الدواء متوفر في الأشكال التالية:

- حبة 5 mg
- حبة 10 mg
- حبة 20 mg
- شراب 1 mg/ml

يؤخذ عن طريق الفم ساعة قبل الطعام أو ساعتين بعد الطعام. الدواء متوفر على شكل حبة 5 mg. يتم تذويب ربع حبة في ٦ مل من الماء. إستعمل المكيال الخاص لإعطاء الدواء، ولا تستعمل ملعقة الطعام العادية. إلتزم دوماً بالجرعة المعطاة من قبل الطبيب.

ماذا تفعل في حال نسيت إعطاء الجرعة:

إذا كان وقت الجرعة التالية بعد أقل من ٤ ساعات، يجب عدم إعطاء الطفل جرعة إضافية والانتفاء بالجرعة القادمة. أما إذا كان الوقت الفاصل أكثر من ٤ ساعات، فيجب إعطاء طفلك الجرعة الناقصة في أقرب وقت ممكن. لا تعط أبداً جرعة مضاعفة.

عوارض جانبية محتملة:

- دوخة خفيفة
- سعال
- فقدان مؤقت لحاسة الذوق
- فقدان الشهية

إتصل بالطبيب فوراً إذا اشتكى الطفل من:

عوارض الحساسية للدواء وهي طفح جلدي، وصعوبة في التنفس، وتورم الوجه أو اللسان.

إرشادات عامة:

أحرص على إعطاء طفلك كمية كافية من السوائل إذ يزيد الدواء من احتمال إصابة الطفل بالجفاف.

أخبر الطبيب إذا كان الطفل يعاني من:

- حساسية ضد أي دواء آخر.
- أمراض في الكلى أو مرض السكري.
- إلتزم دوماً بتعليمات الطبيب.

دواعي الإستعمال:
• قصور القلب الاحتقاني
• ارتفاع ضغط الدم