

Sildenafil

VIAGRA

طفلك وأمراض القلب

www.aubmc.org



AMERICAN UNIVERSITY of BEIRUT MEDICAL CENTER
المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت

كلنا سلامة صحتكم

ما هو هذا الدواء؟

هو دواء ينتمي إلى مجموعة "PDESI" التي تُحبط عمل أنزيم PDES في الرئتين ما يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف عبء العمل على القلب.

كيفية الاستخدام:

يؤخذ عن طريق الفم.

الدواء متوفر في الأشكال التالية:

• حبة 50 mg

• شراب 2.5 mg/ml

يمكن أن يحضر في صيدلية مستشفى الجامعة الأميركية أو في صيدليات أخرى. استعمل المكيال الخاص لإعطاء الدواء ولا تستعمل ملعقة الطعام العادية.

ماذا تفعل في حال نسيت إعطاء الجرعة:

إذا كان وقت الجرعة التالية بعد أقل من ٤ ساعات، يجب عدم إعطاء الطفل جرعة إضافية والاكْتفاء بالجرعة القادمة. أما إذا كان الوقت الفاصل أكثر من ٤ ساعات، فيجب إعطاء طفلك الجرعة الناقصة في أقرب وقت ممكن. لا تعط أبداً جرعة مضاعفة.

عوارض جانبية محتملة:

• احتقان الأنف

• احمرار في الجلد

• ألم في المعدة

• ألم في الرأس

• إسهال

• ألم في العضلات

إرشادات عامة:

• إبلاغ الطبيب عن أي دواء آخر يتناوله طفلك.

دواعي الإستعمال:
• ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي